

La mésange charbonnière

(*Parus major*) est une espèce de passereaux. C'est la plus commune des mésanges.

Elle se caractérise par sa calotte noire, ses joues blanches, son dos verdâtre et une bande noire (ou « cravate ») tout le long de la poitrine et du ventre jaune. Cette bande est moins large chez la femelle que chez le mâle.

Elle mesure environ 14 cm et pèse environ 20 g.



C'est un oiseau grégaire : en dehors de périodes de nidification, elle vit en groupe avec d'autres mésanges.

La mésange charbonnière zinzinule. « Très audibles, ses phrases, basées sur 2, 3 ou 4 notes aiguës et au rythme bien marqué, sont répétées de nombreuses fois.

Une mésange charbonnière peut atteindre une quinzaine d'années mais l'espérance de vie en milieu naturel n'excède pas souvent quelques années (2 à 3 ans).

Alimentation

En période de reproduction (printemps et été), son régime alimentaire est essentiellement insectivore : blattes, sauterelles, criquets, demoiselles, petites libellules, chrysopes, perce-oreilles, punaises, fourmis, mille-pattes, mites, papillons de nuit, mouches, abeilles, guêpes, coléoptères, araignées, opilions, escargots, cloportes. Elle se nourrit aussi de petits fruits et de graines (notamment du hêtre et du noisetier, graines de tournesol, des cacahuètes), de pain et de fromage.



Les oisillons sont nourris essentiellement de larves de papillons dans les forêts à feuille caduque et d'araignées, ainsi que de larves de mouches et de blattes dans les forêts de conifères. Il leur arrive également de voler de la nourriture dans les caches des mésanges nonnettes et des mésanges noires.

Quand son bec n'est pas assez long, elle peut utiliser une aiguille de pin pour déloger des larves, ce qui en fait l'une des rares espèces d'oiseaux à utiliser des outils, ou tapoter de son bec les ruches en hivernage pour inciter des abeilles à en sortir pour s'en nourrir.

Selon des observations effectuées dans les années 1920 au sud de Londres, des mésanges bleues et charbonnières ont développé différentes techniques pour ouvrir les capsules de carton ou d'aluminium des bouteilles de lait déposées le matin sur le perron des maisons anglaises.

Répartition



Elle est présente partout en Europe, en Afrique du Nord et dans la majeure partie de l'Asie.

Habitat



Elle est sédentaire et occupe presque tous les habitats : bois, parcs, jardins, etc. Le nid est construit dans les endroits les plus inattendus : feux de circulation, camions au repos, boîtes à lettres, parpaings, vieilles machines.

Reproduction



Cet oiseau effectue deux couvées de 5 à 12 œufs par an (avril-mai puis juin-juillet). Le [nid](#) est construit dans le trou d'un arbre, d'un mur ou dans un nichoir. Le mâle peut rester auprès de sa compagne pour construire le nid et nourrir les petits. Les œufs sont couvés par la femelle 13 ou 14 jours. Les petits restent au nid entre 16 et 21 jours après l'éclosion. La mésange est fidèle, elle ou un de ses petits par la suite, pourra revenir nicher au même endroit, et ainsi de suite, année après année.

Les mésanges sont utilisées par les jardiniers comme moyen de lutte biologique. Les arboriculteurs soucieux de limiter l'usage de pesticide, placent parfois des nichoirs à mésange dans les vergers afin que celles-ci mangent les vers de la pomme et les pucerons. Cette technique est aussi préconisée pour lutter contre la chenille processionnaire.



Mésanges charbonnières se nourrissant de parasites d'un vieux pommier.

Protection

La mésange charbonnière bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 (modifié en 2009) relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la déplacer, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids, et de détruire ou dégrader son milieu.